

NOTAS ORNITOLOGICAS COLOMBIANAS, II

ARMANDO DUGAND

ARDEIDAE

Pilherodius pileatus (Boddaert).

Ardea pileata Boddaert, Table pl. enlum., 1783, p. 54 (Cayena, ex pl. enlum. No. 907).

Ejemplares examinados: Uno de Aguada de Pablo, orilla de la laguna de Guájaro, Atlántico, Feb. 1 a 4, 1936; dos de Palmar de Varela, río Magdalena, Atlántico, abril 16 a 18, 1938; uno de Apiay, Caño Suria, Llanos del Meta, enero 26, 1942; uno de Villavicencio, Meta, junio 9, 1944; un ejemplar joven sin localidad.

El Museo del Instituto de La Salle, en Bogotá, posee un ejemplar procedente de Barrigón, sobre el río Humea, Llanos del Meta, coleccionado por el Hermano Nicéforo el 3 de agosto de 1925. Además, el Hermano Nicéforo me informa que ha observado esta especie en tres lugares del Departamento Norte de Santander: La Arenosa, 32 kms. al norte de Cúcuta (abril de 1936); cerca del río Zulia, 31 kms. al oeste de Cúcuta (octubre de 1942) y en las orillas de la quebrada La Floresta, 24 kms. al norte de la misma ciudad (septiembre de 1944).

En lo que respecta a Colombia esta hermosa garza había sido señalada antes solamente en el Sinú y el río Cauca (Chapman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 36, 1917, p. 230) y en el Departamento del Magdalena: Cinto, Tucurínca, río Badillo y río Guatapurí (Todd y Carriker, Ann. Carnegie Mus., 14, 1922, pp. 134 y 135). Tiene, por lo visto, amplia distribución en nuestro país pero es especie bastante rara. En el Bajo Magdalena la he observado con certeza tan sólo unas doce veces en quince años; en todas las ocasiones andaba solitaria, excepto una sola vez en que logré ver dos ejemplares juntos en los pantanos de Guájaro, Atlántico. Con la ayuda de anteojos de larga

vista, y desde la cubierta de un buque, vi otras dos —pero separadas por unos tres kilómetros— en las orillas del brazo de Loba, río Magdalena, cerca de Pinillos, el 20 de julio de 1943. Prefiere casi siempre las riberas sombreadas por árboles frondosos.

CICONIIDAE.

Euxenura galeata (Molina).

Ardea galeata Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili, 1782, p. 235 (Chile).

El Maguarí o Cauauá —como llaman a esta cicónida los brasileños— no había sido señalado hasta ahora (*) en Colombia. En una película cinematográfica documental, tomada hace unos 4 o 5 años en las llanuras del Vichada, aparecen varios individuos de esta inconfundible especie. Además el Hermano Nicéforo, (*) del Instituto de La Salle, Bogotá, me informa de dos ejemplares coleccionados respectivamente en los llanos de Arauca y cerca de Villavicencio. Esta última localidad, situada en la base de los Andes Orientales colombianos, representa ahora la mayor extensión occidental conocida del área de *Euxenura galeata*.

ACCIPITRIDAE.

Accipiter superciliosus superciliosus (Linné).

Falco superciliosus Linné, Syst. Nat., ed. 12, 1766, p. 128 (Surinam).

La raza nominal de *Accipiter superciliosus* había sido anteriormente señalada de manera vaga por Swan en "Colombia oriental", sin indicación de localidad definida. El Instituto de Ciencias Naturales posee tres ejemplares, dos de los cuales (♂ ♀) fueron obtenidos por mí en la selva de galería que bordea el pequeño río Quenane, 35 kilómetros al este de Villavicencio; el tercero (♀) por el señor Oscar de Bedout en San Martín, 55 kilómetros al sur de Villavicencio. El señor Rodolphe Meyer de Schauensee, de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, quien de manera muy diligente identificó los dos ejemplares míos, me informa que aquella institución posee un ejemplar de La Morelia, cerca de Florencia, Caquetá. Se extiende así el área de distribución conocida de *superciliosus* hasta la base

(*) Véase el trabajo del Hermano Nicéforo, en este mismo boletín, página 369.

de la Cordillera Oriental en Colombia, desde el Caquetá hasta el Meta.

La otra raza que habita en Colombia —*Accipiter superciliosus eximiosus* Bangs & Penard— ha sido señalada en la Costa del Pacífico, el Chocó, el bajo Cauca antioqueño y la región subtropical del macizo de Santa Marta.

RALLIDAE.

Laterallus exilis (Temminck).

Rallus exilis Temminck. Pl. Col., livr. 88, 1831, pl. 523 y texto (sin localidad; Cayena, según Hellmayr Nov. Zool., 14, 1907, p. 90).

Un ejemplar adulto, que maté en la orilla septentrional de la laguna de Guájaro, cerca de La Peña, Departamento del Atlántico, el 6 de junio de 1936, es el primero de esta especie que se obtiene en Colombia. Este ejemplar, depositado en la colección de la Institución Smithsonian, Washington, fue registrado por Herbert Friedmann (Bds. North and Middle Amer., pt. 9, U. S. Nat. Mus., Bull. 50, 1941, p. 163). Señalé la existencia de esta rálida en la fauna colombiana en Rev. Acad. Colomb. Cienc. 3, No. 9-10, 1939, p. 52, pero sin indicación precisa de localidad. La he observado varias veces en las orillas pantanosas de la mencionada laguna de Guájaro, en la de Manatí y en las ciénagas que bordean el río Magdalena, al sur de Barranquilla. Anda a veces en compañía de su congénere *Laterallus albigularis albigularis* Lawrence pero es menos abundante que ésta. A estas dos especies de *Laterallus*, lo mismo que a *Porzana flaviventer bangsi* Darlington, las conoce el vulgo costeño indistintamente con los nombres de "Pollito de agua", "Perdiz de agua" o "Piache de laguna".

PSITTACIDAE.

Touit stictoptera (Sclater).

Urochroma stictoptera Sclater. Proc. Zool. Soc. London, 1832, p. 112 ("Hab. in Nov. Granata int." = Fusagasugá, sugerido por mí en CALDASIA 3, No. 13, p. 341, 1945).

Urochroma emmae Berlepsch. Journ. f. Ornith., 1889, p. 202 (descr. nulla); Salvadori, Cat. Bds. Brit. Mus. 20, 1891, p. 357.

En el número anterior de CALDASIA me ocupé de la identidad específica de *stictoptera* y *emmae*. Tres ejemplares adicionales (un ♂

adulto, un ♂ joven, una ♀) fueron traídos a principios de julio de la región de Fusagasugá por el señor Oscar de Bedout, a quien manifiesto mis sinceras gracias por su valiosa colaboración en este interesante caso. Estos ejemplares, obtenidos en un mismo sitio y tiempo por el señor de Bedout, corroboran no sólo lo que ya anoté respecto de la identidad específica de "*emmae*" con respecto a *stictoptera* sino también mi conjetura de que los machos jóvenes podían ser de coloración igual a la de las hembras adultas. En efecto, el macho joven, examinado en esta ocasión con cuidado por el señor José I. Borrero en cuanto a la determinación del sexo, tiene las coberteras supra-alares verdes. Las alas de estos tres ejemplares miden 130-131 mm., la cola 56-58 mm.

***Amazona festiva festiva* (Linné).**

Psittacus festivus Linné, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, p. 101 ("Indias", error = río Amazonas brasileño fijado como localidad típica por Hellmayr).

Esta especie de loro se señala por primera vez en Colombia con un ejemplar vivo procedente de Mitú, Vaupés, cerca de la frontera colombo-brasileña. El ejemplar a que me refiero lo tiene en su casa de "Las Granjas", cerca de Bogotá, el distinguido aviador Teniente Coronel Luis Alberto García-Bonilla.

Como el límite nor-occidental del área de dispersión conocida de *Amazona festiva festiva* es la región amazónica comprendida entre el Río Negro brasileño y el oriente del Ecuador y el Perú, no es sorprendente hallar la especie en la parte de Colombia comprendida en ese límite.

***Deroptyus accipitrinus accipitrinus* (Linné).**

Psittacus accipitrinus Linné, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, p. 102 ("Indias", error = Cayena, subst. por Hellmayr, Nov. Zool. 12, 1905, p. 303).

El doctor Leopoldo Richter, entomólogo del Instituto de Ciencias Naturales, me trajo hace poco de Villavicencio excelentes dibujos coloreados de dos ejemplares vivos que pertenecen al coronel Flores Machado, residente en aquella ciudad. Uno de estos fue capturado en Mitú, Vaupés, cerca de la frontera con el Brasil y el segundo en la región de Puerto Carreño, cerca de la confluencia de los ríos Orinoco y Meta. Son los primeros que se señalan en Colombia y constituyen una muy interesante adición a la avifauna de este país.

TYTONIDAE.

Tyto alba guatemalae (Ridgway).

Strix flammea var. *Guatemalae* Ridgway, Bull. Essex Inst., 5, 1873, p. 200 (Guatemala hasta Panamá; tipo de Chinandega, Nicaragua).

Tyto alba subandeanae L. Kelso, Biol. Leaflet, No. 9, 1938, sin paginación ("Bogotá", Colombia).

Un ejemplar de Los Pendales, Atlántico, abril 5, 1937.

Con respecto al ejemplar citado, el cual se halla depositado en la Institución Smithsonian, y que hasta ahora se consideraba representativo de *Tyto alba subandeanae*, me escribió recientemente el doctor Alexander Wetmore: "...I have had occasion to look into this matter again in connection with the identification of a barn owl from Panama, and have found to my surprise that the type of *subandeanae* cannot be separated from the light phase of *Tyto alba guatemalae* (Ridgway) which is the resident form of Central America. The dark phase... is the most common one... The light phase seems to be quite rare. I can match your bird from Los Pendales and the type specimen of *subandeanae* absolutely with Central American skins. In fact, I have one from Panama that is almost identical to your specimen. The type of *subandeanae* is an old trade skin that was entered in our catalogue on February 17, 1860. It has no indication of locality except that it is marked "Bogotá".

Con estos datos, que agradezco al doctor Wetmore, se extiende el área conocida de *guatemalae* desde la América Central hasta el litoral caribe colombiano. Antes se consideraba limitada por la Zona del Canal de Panamá.

Esta rapaz nocturna, vulgarmente llamada "Lechuza" o "Lechuza blanca" por los habitantes de la Costa, es bastante común en las poblaciones de aquella región; la he observado varias veces en la ciudad de Barranquilla, anidando en los tejados.

En el estómago del ejemplar de Los Pendales se hallaron restos de ratones de monte y de murciélagos.

STRIGIDAE.

Bubo virginianus elutus Todd.

Bubo virginianus elutus Todd, Proc. Biol. Soc. Wash., 39, 1917, p. 6 (Lorica, Bolívar, Colombia).

Dos ejemplares montados en la colección zoológica del Colegio Biffi, Barranquilla, coleccionados en el Departamento del Atlántico

sin localidad precisa, y otros dos cogidos por el señor Pedro Giacometto en Los Pendales, en el mismo Departamento, pertenecen a esta subespecie. En la colección del Instituto de Ciencias Naturales hay otro procedente de Riohacha, señalado anteriormente por Lehmann (CALDASIA 2, No. 9, 1944, p. 416). La subespecie *elutus* está aparentemente restringida en la región costanera caribe de Colombia.

NYCTIBIIDAE.

Nyctibius grandis (Gmelin).

Caprimulgus grandis Gmelin, Syst. Nat., 1, 1789, p. 1029 (Cayena).

En la colección del Instituto hay cinco ejemplares; uno, del viejo Museo Nacional, lleva la anotación de "Llanos del Meta", otro fue traído de Leticia, Amazonas, por el señor Carlos Lehmann, en octubre de 1939. Los otros tres fueron cogidos por el señor Lehmann y yo en los bosques espesos del Caño Suria, cerca de Apiay, al sureste de Villavicencio, el 25 y 26 de enero de 1942.

Esta enorme nictíbida también se encuentra en las selvas del Bajo Atrato, en la parte septentrional del Chocó.

Ridgway (Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 50, 6, 1914, p. 588) registra un ejemplar del Bajo Magdalena.

CAPRIMULGIDAE.

Chordeiles minor sennetti Coues.

Chordeiles popetue sennetti Coues, Auk, 5, 1888, p. 37 (Pembina Mountains, North Dakota).

Hasta ahora nada o muy poco se sabía acerca de la extensión meridional de las migraciones invernales de esta subespecie norteamericana, aunque se presumía que alcanzaba a la América del Sur. Un ejemplar, coleccionado entre el 15 y el 20 de octubre de 1943 en la Sabana de Bogotá, fue gentilmente identificado por el señor Rodolphe Meyer de Schauensee, de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Esta caprimúlgida hace su aparición en la Sabana de Bogotá a fines de septiembre.

La subespecie *sennetti*, que anida en las llanuras de las Dakotas, Estados Unidos, se registra así por primera vez en Colombia.

BUCCONIDAE.

Notharchus macrorhynchos hyperrhynchos (Sclater).

Bucco hyperrhynchos Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond., 1855, p. 193, pl. 105 (Alto Amazonas).

Un ejemplar macho de Apiay, Llanos del Meta, marzo 20, 1939, es referible a esta raza, que hoy se considera co-específica de *macrorhynchos*.

Otros dos ejemplares montados, originarios del antiguo Museo Nacional, llevan anotado "Tolima" como localidad de procedencia. Con todo, la experiencia me ha enseñado que no se puede dar mucho crédito a las etiquetas de tal Museo. Estos ejemplares sólo difieren del de Apiay por tener el blanco de la frente un poco más extendido. Por lo demás son indistinguibles.

Nystactes tamatia pulmentum (Sclater).

Bucco pulmentum Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond., 1855, p. 194, pl. 106 (Alto Amazonas, Chamicuro, Perú oriental).

Un macho de Leticia, Amazonas, octubre 18, 1939.

Esta bucónida no se había registrado antes en la avifauna colombiana pero no es sorprendente el haberla hallado en Leticia considerando su distribución geográfica conocida, que comprende la región amazónica superior en el oriente del Ecuador y del Perú. El color ocráceo claro de la garganta del ejemplar de Leticia sugiere cierta afinidad con la recientemente descrita raza *inexpectatus* Todd del Amazonas Medio brasileño.

DENDROCOLAPTIDAE.

Nasica longirostris (Vieillot).

Dendrocopos longirostris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Nouv. ed., 26, 1818, p. 117 (Brasil).

Un ejemplar, coleccionado en Leticia, Amazonas, Oct. 16, 1939, es el primero de esta especie que se registra en territorio colombiano.

Culmen: 67; mandíbula superior, desde la comisura bucal hasta la punta: 71; ala: 138; cola: 126 mm.

TURDIDAE.

Turdus grayi incomptus (Bangs).

Planesticus luridus (non *Turdus luridus* Hermann 1804) Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 38, 1854, p. 4 ("Nouvelle Grenade").

Merula incompta Bangs, Proc. Biol. Soc. Wash., 12, 1898, p. 144 (Santa Marta).

Dos ejemplares coleccionados en el Departamento del Atlántico: uno en Santa Cruz, cerca de Los Pendales, y otro entre Palmar de Varela y Ponedera, hacienda "El Paraíso", extienden ligeramente el área de distribución conocida de esta subespecie hasta el occidente del río Magdalena. Anteriormente sólo se había señalado al oriente de dicho río, en la parte septentrional del Departamento del Magdalena (Santa Marta, Mamatoco, Bonda, Cacagualito, Aracataca, Turcurina, Fundación, Fonseca).

He visto este tordo y oído su melodioso canto muchas veces en las inmediaciones de Barranquilla, especialmente en las arboledas de "El Prado".

VIREONIDAE.

Vireo philadelphicus (Cassin).

Vireosylva philadelphia Cassin, Proc. Acad. Nat. Hist. Sci. Phila., 5, 1851, p. 153 (Philadelphia, Pennsylvania).

El doctor Rodolphe Meyer de Schauensee, quien nos hizo el favor de identificar el único ejemplar que poseemos, me escribe que en la colección de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia hay otros dos ejemplares de la misma especie procedentes de Juradó, Chocó, muy cerca de la frontera colombo-panameña en la costa del Pacífico. Esos ejemplares y el nuestro, coleccionado el 5 de noviembre de 1943 en los jardines de la Ciudad Universitaria, a pocos pasos del Instituto, son los primeros que se registran en el continente suramericano.

FRINGILLIDAE.

Pitylus grossus grossus (Linné).

Loxia grossa Linné, Syst. Nat., ed. 12, 1, 1766, p. 307 ("América = Cayena").

Una hembra de Leticia, Amazonas, Oct. 19, 1939.

Anteriormente se había señalado la especie *Pitylus grossus*, sin diferenciación de razas, al oeste de los Andes Orientales, principalmen-

te en la costa del Pacífico (Chocó y Nariño) y en el piso tropical de Antioquia (Remedios, Nechí, Dabeiba), así como cerca de Honda, Tolima, pero estos "records" deben referirse a la subespecie *saturatus* Todd (cf. Hellmayr, Cat. Bds. Amer., pt. 11, 1938, p. 52).

La raza nominal se registra aquí por primera vez en territorio colombiano. Era de esperarse encontrarla en la región de Leticia teniendo en cuenta su distribución geográfica, que abarca, en sus límites septentrionales conocidos, desde las Guayanas, el sur de Venezuela y el norte del Brasil, hasta el oriente del Ecuador y la parte amazónica del Perú.