

ORNITOLOGIA

NOTAS SOBRE AVES COLOMBIANAS

DOS NUEVAS AVES PARA LA AVIFAUNA COLOMBIANA

POR

JOSE IGNACIO BORRERO H. y JORGE HERNÁNDEZ CAMACHO

Durante la identificación de material ornitológico en nuestra colección hemos encontrado dos aves que no habían sido señaladas previamente en Colombia. Son ellas:

Cinnycerthia unirufa chakei Acevedo y Ginés

Cinnycerthia unirufa chakei AVELEDO Y GINÉS, 1952 (junio), *No vedades Científicas, Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. La Salle (Caracas)*, Ser. Zool., 6: 7-8. (Río Negro, Sierra de Perijá, Zulia, Venezuela, 2900 m. alt.).

Representada por dos ejemplares (♂ y ♀), coleccionados por M. A. Carriker Jr. en la Laguna de Junco, al pie del Cerro Pintado, en la Sierra de Perijá, Departamento del Magdalena. Estos ejemplares fueron obsequiados por el United States National Museum, y fueron referidos por De Schauensee (1951, *Caldasia*, 5 (25): 890) a *C. u. unirufa*.

Aparentemente un carácter diagnóstico de esta subespecie es el de poseer el iris de color crema (rojo carmín en la subespecie nominotípica). La hembra de nuestra colección tiene los siguientes detalles (aparentemente anormales): las plumas más próximas a los orificios nasales, lo mismo que las de los párpados en contorno, son de un color crema anteadado y algunas plumas tibiales cercanas a la articulación tibio-tarsiana son blancas.

	Dimensiones			
	Ala	Cola	Culmen (desde la base)	Tarso
♂	88	82.5	15.5	30
♀	78	79	16.5	30

***Dendroica pensylvanica* (Linnaeus)**

[*Motacilla*] *pensylvanica* LINNAEUS, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 333. (Pennsylvania, Estados Unidos)

Mariquita, Departamento del Tolima, 1 ♀ (octubre 23, 1954).

Cordillera de La Paz, Hacienda Montebello, Departamento de Santander, 800 m., 1 ♂, 1 ♀ (noviembre 11, 1956).

Río Chucurí, Hacienda Montebello, Departamento de Santander, 400-500 m., 1 sin sexo anotado (noviembre 15, 1956).

En noviembre del año pasado tuvimos oportunidad de comprobar la relativa abundancia de esta especie en la selva húmeda y cafetales de las faldas de la Cordillera de La Paz, como también en los rastrojos y restos de bosque cercanos al río Chucurí.

Aparentemente este es el primer registro de migración para esta especie en Sur América.