

SERTULA FLORAE COLOMBIAE — XV  
NUEVAS MELASTOMATACEAS

Por

LORENZO URIBE-URIBE, S. I.<sup>1</sup>

El notable aumento de las colecciones del Herbario Nacional Colombiano muestran la riqueza de la flora melastomatácea de Colombia. Uno de los géneros más ricos y más bien caracterizados es *Blakea*. En este artículo describo dos nuevas especies muy interesantes. Dejo consignada mi gratitud para el notable dibujante, don Silvio Fernández Valencia, a quien se deben las magníficas ilustraciones y muchos datos y mediciones de órganos pequeñísimos, que facilitaron las descripciones exactas de las plantas.

***Blakea longipes* L. Uribe, sp. nov.**

Lámina 1.

In monogr. Cogniaux juxta species 23-27 locanda: ab iis denso et minutulo tomento pinoide foliorum subtus ramulorumque praecipue differens.

Arbor. Ramulis robustissimis 4-gonis ad nodos valide incrassatis, ultimis furfuraceis vel atrobrunneis tomentosis. FOLIA robuste petiolata: *petiolo* crasso, 4-gono, costulato, pubescenti, 2-3 cm longo; *lamina* ovali vel elliptica, rigide coriacea, 11-14,5 cm longa et 6-9 cm lata; basi apiceque rotundata vel obtusa, mucronulata, integra; 3-nervia nervulo marginali sat tenui praetermissa; supra glabra vel primo leviter farinoso-tomentella, subtus dense pinoide-tomentosa, ferruginea vel atrobrunnea, costa et nervis lateralibus sat robustis, venis transversis 4-5 mm inter se distantibus. FLORES crassi, solitarii in axillis foliorum superiorum: *pedunculo* 4-angulato, costulato, 6 cm longo, validissimo; *bracteis* robustis rigidisque: exterioribus 3-4 cm longis usque ad medium connatis apice subacutis, interioribus liberis 3 cm longis apice rotundatis. PETALIS albo-roseis fere orbicularibus, 2,2 cm longis atque 2-2,4 cm latis. STAMINIBUS (adhuc immaturis) in annulum cohaerentibus, antheris subovatis 6,5 mm longis et 4 mm latis. Caetera ignota.

<sup>1</sup> Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural, Bogotá.




LÁMINA 1. *Blakea longipes* L. Uribe sp. nov. (Rivera & al. 783).  
 a, botón floral próximo a la antesis, envuelto en sus brácteas externas; b, pétalo;  
 c, bráctea interna; d, estambre.

TYPUS: Colombia, Departamento de Antioquia, Municipio de Frontino, 3.500 m alt.: Jaime Rivera, Manuel del Llano & Pedro Ruiz, No. 783, diciembre 1º, 1970. HOLOTYPE.

Especie notable y muy llamativa por sus robustas flores solitarias en axilas contiguas de los ramales superiores. La flor está sostenida por un robusto y largo pedúnculo: a ello alude el epíteto específico. De las especies citadas en la diagnosis inicial se diferencia especialmente por el fino tomento de sus órganos: las afines son completamente glabras.

**Blakea fissicalyx** L. Uribe, sp. nov.

Lámina 2.

*Bl. calypratae* Gleas. persimilis, ab ea tamen foliorum magnitudine, forma atque indumento bene distincta.

Arbor alta. Innovationibus densissime ochraceo-tomentosis. Ramulis sub 4-gonis. FOLIA laete sepiaceae: petiolo valido 4-6 cm longo plus minusve tomentello; lamina subcoriacea vel rigide chartacea, 13-24 cm longa et 5-10 cm lata, integra, basi obtusa vel subobtusa, apice in longum acumen protrecto; 5-plinervia jugo submarginali sat tenui; supra glabra et nitida, subtus in superficie item nitida nervis tamen dense velatis pilis minutissimis stellatis pulchre albicantibus, venis transversis 3 mm inter se distantibus. FLORES axillares ut plurimum ternatim dispositi: pedunculo 1,5-2,5 cm longo superne incrassato, tomentello. Bractae conformes, spatulatae, 1 cm longae, acutae vel subacutae minutissime stellulato-sublepidotae. Calyx calyptriformis, anguste ovoideus, 10-12 mm longus, arachnoideo squamulosus squamulis lageniformibus circa 1 cm longis, apiculatus, in maturitate ad torum circumscissilis. Petala rosea fere orbicularia et sublobulata, 1,6 cm longa et 1,7 cm lata, margine minutissime papillato-ciliata. Stamina 8,5 mm longa, filamento circa 4 mm longo; conectivo robusto in brevem carinam elevato, 5 mm longo; theca subreniformi item 5 mm longa, apice 2-porosa.

TYPUS: Colombia, Departamento del Cauca, Municipio de El Tambo, Cordillera Occidental, cerro de Munchique, alt. 2.640 m: Alvaro Lobo A. 67, mayo 10 de 1979. HOLOTYPE: COL 196832. Especie de *Blakea* muy interesante por el cáliz caliptriforme y circuncísil y las brácteas espatuladas: características "inesperadas" en un género tan uniforme. Aparecieron por vez primera en *Blakea calyprata* y su var. *latior*, ambas de Gleason. A pesar de esa "anomalía" este autor conserva un género unitario. Quizás no sea ese el parecer de todos los botánicos.

La nueva especie tiene el envés foliar de color sepia y casi glabro. En cambio en las de Gleason es densamente tomentoso con diminutos pelillos estrellados que lo cubren por completo y son de color ocre rojizo.




LÁMINA 2. *Blakea fissicalyx* L. Uribe (detalles del Tipo).  
 a, Tomento del hipanto, x 20; b, Pétalo, x 2; c, Tomento del envés foliar, x 20;  
 d, Estambre, x 2; e, Bráctea, x 2.