

DOS ESPECIES NUEVAS DE *OURATEA* AUBLET (OCHNACEAE) DE COLOMBIA

Por
C. SASTRE *

ABSTRACT

Two new colombian species of *Ouratea* Aublet (Ochnaceae) are described. Relationships are established with *O. gigantophylla* (Erhard) Engler and *O. macrophylla* van Tieghem.

Entre el material de *Ouratea* Aublet (Ochnaceae) recolectado recientemente en Colombia, no he podido referir tres especímenes a las especies ya descritas. Estas plantas pertenecen a dos especies nuevas, sistemáticamente cercanas a *O. gigantophylla* (Erhard) Engler y a *O. macrophylla* van Tieghem.

1. *Ouratea kananariensis* Sastre sp. nov.

Fig. 1

Arbor, 25 m alta, ramis glabris. Folia petiolo crasso 2 cm longo, lamina coriacea 30-40 x 9-13 cm, obovata, aliquantum asymmetrica, basi aliquantum attenuata, margine denticulata, apice acuminata, nervis prominentibus, stipulis caducis. Inflorescentia racemosa, 30 cm longa. Flores pedunculis 7-8 mm longis, sepala 5, coriacea 5 x 3 mm, triangulare; petala 5, 9 x 7 mm, stamina 10, sessilia, 0,5 mm longa, carpella 5, gynophoro 1 mm longo, stylo unico 6 mm longo. Fructus ignotus.

TYPUS. COLOMBIA, Vaupés, río Kananari y Cerro Isibukuri, 250 m (cerca del río), 700 m (en la cumbre del cerro, suelo pedregoso de arenisca), leg. H. García-Barriga 13773, 29-30 Nov 1951 COL.

* Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Phanérogamie 16, rue Buffon 75005, Paris France.




FIGURA 1. *Ouratea kananariensis* Sastre. 1. Hoja e inflorescencia. 2. Detalle del margen y de la venación. 3. Botón sin sépalos. 4. Flor completa, abierta. 5. Pétalo. 6. Estambres. 7. Gineceo. Leg. García-Barriga 13773.

2. *Ouratea tumacoensis* Sastre sp. nov.

Frutex vel arbor, 6-10 m alta, ramis glabris. Folia petiolo crasso, 1 cm longo, lamina coriacea 35-50 x 12-13 cm obovata, basi attenuata, margine undulato-denticulata, apice acuminata, nervis principalibus prominentibus, stipulis triangularis 1 mm altis. Inflorescentia racemosa 11 cm longa, pilosa. Flores pedunculis pilosis, 10 mm longis, sepala 5, coriacea, 8-10 x 2 mm, triangulare, pilosa pagine inferiore, petala 5, 11 x 6 mm, obovata, stamina 10, sessilia 5 mm longa, caduca, carpella 5, gynophoro 1 mm longo, stylo unico 6 mm longo. Carpophoro cylindrico, 4-6 mm diam., carpello 15 mm longo, 5-6 mm diam.

TYPUS. COLOMBIA, Nariño, margen derecha del río Rosario. En el bosque situado 3 km arriba de la desembocadura del río Caunapí, y en la margen derecha, leg. R. Romero Castañeda 5582, 5 Mar 1956 COL (con flores).

PARATYPUS. COLOMBIA, Nariño, Tumaco, vereda de Santa María, río Rosario; en el bosque situado detrás del caserío, leg. R. Romero Castañeda 5171, 18 Jun 1955 COL (con frutos).

Estas dos especies nuevas pertenecen a un conjunto de especies con hojas largas. Este se subdivide en dos grupos:

— El primero con hojas sésiles a subsésiles y con base auriculada a cordada incluyendo *O. glaziovii* Van Tieghem, *O. theophrasta* (Planchon) Sastre, *O. pulchrifolia* Ducke, *O. verticillata* (Vellozo) Engler, *O. costaricensis* Standl. et *O. tuerkheimii* Donn. Sm.

— El segundo con hojas pecioladas y con base redonda a atenuada incluyendo *O. gigantophylla* del estado de Bahía (Brasil), *O. macrophylla* de la región de Río de Janeiro (Brasil), *O. sp. nov.* de Guyana francesa, *O. kananariensis* del Vaupés (río Kananari) y *O. tumacoensis* de Nariño (cerca de Tumaco).

O. kananariensis se distingue de las otras especies de este grupo por sus hojas onduladas en relación con la venación saliente y por su pecíolo más largo (2 cm, mientras que tiene 1-1,5 cm en las otras especies).

O. tumacoensis se distingue de las otras especies de este grupo por sus inflorescencias (y los sépalos) pilosas y sus hojas más grandes (hasta 50 cm de longitud).