

*Cuidado de los polluelos en el primer mes*

La infección umbilical de los pollos es frecuente en la incubación artificial; en la natural es rara. Las causas de esta frecuencia son desconocidas. Esta enfermedad se presenta en los casos en que la yema no se absorbe completamente y queda al lado de los intestinos un glomero abdominal, que suele descomponerse dando lugar a esta infección.

Para salvar estos animales es preciso extraer ese glóbulo y suturar la herida con la asepsia consiguiente.

La observación de los pollos en los primeros días hará notar estos casos que suelen presentarse a los cuatro o cinco días después del nacimiento.

En este período es cuando los polluelos necesitan más las atenciones del hombre: los rigores atmosféricos, la falta de higiene, la nutrición malsana o insuficiente, el brote de la pluma y otra con causas, ocasionan muchas bajas en esta época de su juventud.

La primera atención de los pollos tan pronto como salen del huevo es tenerlos a una temperatura de 20 a 25 grados; a falta de una disposición más perfecta, puede bastar colocarlos en una vasija que contenga salvado a prudente distancia de la lumbre. La práctica vulgar de dar a los recién nacidos un grano de pimienta negra no está desmentida por su resultado y debe respetarse. Durante las primeras 24 horas no deben tomar ningún alimento. A partir de esta fecha se le dará miga de pan con huevo cocido picado, remojando la mezcla con leche. No debe ponerse más de lo necesario; es preferible repetir la ración a que sobre y se altere. Al cuarto día pan rallado con leche y arroz cocido. En la segunda semana, avena y trigo triturados y gachuela de salvado. En la tercera semana maíz triturado y granos sin triturar. Después de esta época, añádanse algunos alimentos verdes a las raciones apuntadas. Repítanse las comidas cada tres horas.

En los tiempos que amenazan lluvia evítense que se mojen los polluelos porque mueren mucho de estas mojaduras. Los recipientes de beber deben ser muy bajos y poco profundos para que cumplan cómodamente esta necesidad y no haya peligro de ahogamiento. Los polluelos saldrán tarde y se recogerán temprano. Vigilar la higiene de la habitación. Con tales principales cuidados está asegurada la crianza de estos volátiles.