
NOTAS DE LABORATORIO

ESTENOSIS DEL INTESTINO DELGADO POR PERITONITIS BACILAR

*Por Carlos Trujillo Venegas y Jorge Rosas Cordovés,
Director y Jefe del Laboratorio de Rayos X del Hospi-
tal de San Juan de Dios.*

Las estenosis del intestino delgado tienen causas múltiples, pero todas poseen una fisonomía radiológica especial que las diferencian de los estancamientos yeyuno-ileales transitorios.


Las causas que pueden provocar una estenosis del intestino delgado son numerosas: Cáncer del intestino; malformaciones congénitas; enteritis agudas, tuberculosis enteroperitoneal. El síndrome radiológico es único cualquiera que sea la causa productora de la estenosis. Los signos suministrados por la radioscopia y por la radiografía son insuficientes para hacer un diagnóstico de la naturaleza y de la localización de las lesiones.

El aspecto radiológico de las estenosis es el siguiente: Al examinar al enfermo en posición vertical y sin preparación previa, se observan varios niveles horizontales del líquido, a alturas variables y por encima de ellos, ampollas gaseosas. La obscuridad del líquido contrasta con la transparencia del gas, y el límite superior del depósito se marca nítidamente. Este aspecto es característico y se encuentra siempre que existan estenosis intestinales suficientemente apretadas y capaces por consiguiente de producir estancamiento del líquido.

En algunos casos los niveles líquidos se superponen siguiendo una dirección oblicua ascendente y en su conjunto tienen un aspecto especial conocido con el nombre de imagen en tubos de órgano. En realidad, la sucesión de las estrecheces recuerda la disposición de los tubos de un órgano o de un capador.

En el decúbito ventral la imagen descrita anteriormente desaparece: los niveles de líquido no se hacen visibles, únicamente se encuentran gran cantidad de gases intestinales.

De todas las entidades capaces de producir estenosis múltiples del intestino, la más frecuente es la peritonitis tuberculosa fibro-adhesiva.



El proceso inflamatorio termina en la formación de adherencias que son la causa de las estrecheces.

La radiografía que acompaña a estas líneas constituye un bello ejemplo. En ella se observan varios niveles de líquido a diferentes alturas y en sitios diversos.

Esta radiografía ha sido tomada en posición vertical y sin ninguna preparación.

El diagnóstico radiológico de estenosis múltiples del intestino delgado fue comprobado por la laparotomía exploradora en la cual se encontró una peritonitis fibro-adhesiva.

Revista de la Facultad de Medicina—Bogotá.