

# PRUEBA ELEMENTAL DEL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA<sup>a</sup>

## A SIMPLE PROOF OF THE FUNDAMENTAL THEOREM OF ALGEBRA

RICARDO PÉREZ-MARCO<sup>b\*</sup>

Recibido 8-03-2021, aceptado 15-03-2021, versión final 16-03-2021.

Artículo Invitado

**RESUMEN:** Sin pretensiones de originalidad, se presenta una demostración elemental del Teorema Fundamental del Álgebra, que no precisa Análisis Complejo y con uso mínimo de nociones de Topología, de manera que puede impartirse en un primer curso de Cálculo Diferencial.

**PALABRAS CLAVE:** Raíces; polinomios complejos; teorema fundamental del Álgebra.

**ABSTRACT:** We present a simple short proof of the Fundamental Theorem of Algebra, without Complex Analysis and with a minimal use of Topology. It can be taught in a first year Calculus class.

**KEYWORDS:** Roots; complex polynomials; fundamental theorem of algebra.

### **1. ENUNCIADO**

**Teorema 1** (Fundamental del Álgebra). *Todo polinomio no constante  $P(z) \in \mathbb{C}[z]$  con coeficientes complejos tiene alguna raíz compleja.*

La demostración se basa en los siguientes puntos elementales:

- Quitando a  $\mathbb{C}$  un número finito de puntos queda un conjunto conexo.

Esto resulta de que el conjunto resultante es conexo por arcos, pues siempre se pueden unir dos puntos mediante una línea poligonal que evita el conjunto finito de puntos eliminados. Por supuesto, esta propiedad es falsa para la recta real  $\mathbb{R}$ , para la cual cualquier punto es un punto de corte.

<sup>a</sup>Pérez-Marco, R. (2021). Prueba elemental del Teorema Fundamental del Álgebra. *Rev. Fac. Cienc.*, 10(2), 6–8. DOI: <https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v10n2.94184>

<sup>b</sup>CNRS, IMJ-PRG, Université de Paris, Boîte courrier 7012, 75005 Paris Cedex 13, France

\* Autor para correspondencia: [ricardo.perez.marco@gmail.com](mailto:ricardo.perez.marco@gmail.com)

- Todo polinomio tiene un número finito de raíces.

Esto resulta de poder dividir  $P$  por  $z - \alpha$  cada vez que  $\alpha \in \mathbb{C}$  es una raíz.

- El Teorema de la Función Implícita.

El cual es un teorema básico de un primer curso de Cálculo Diferencial.

## 2. DEMOSTRACIÓN DETALLADA

Basta considerar un polinomio mónico  $P$  de grado  $d \geq 1$ . Sea  $\mathcal{C}$  el conjunto finito de los puntos críticos de  $P$ , estos son las raíces de  $P'$ , y  $\mathcal{D} = P(\mathcal{C})$  el conjunto finito de los valores críticos de  $P$ . Sea  $R = \{c \in \mathbb{C}; \text{el polinomio } P(z) - c \text{ tiene al menos una raíz simple y ninguna doble}\}$ . Entonces:

- $R \subset \mathbb{C} - \mathcal{D}$ . Porque si  $c \in \mathcal{D}$ , entonces  $c = P(z_0)$  para algún punto crítico  $z_0 \in \mathcal{C}$ , por lo tanto  $P'(z_0) = 0$  y  $P(z) - c = 0$  tiene  $z_0$  como raíz doble. Obsérvese que  $\mathbb{C} - \mathcal{D}$  es abierto y conexo puesto que  $\mathcal{D}$  es finito.
- $R$  es abierto. Esto es una aplicación simple del Teorema de la Función Implícita. Sea  $c_0 \in R \subset \mathbb{C} - \mathcal{D}$ , y  $z_0 \in \mathbb{C}$  una raíz de  $P(z) - c_0$ . Aplicando el Teorema la Función Implícita a la ecuación  $F(z, c) = P(z) - c = 0$ , puesto que  $\frac{\partial F}{\partial z}(z_0, c_0) = P'(z_0) \neq 0$ , existe una vecindad  $U$  de  $c_0$  tal que para  $c \in U$  se tiene una raíz  $z(c)$  de  $P(z) - c$ . Tomando  $U$  suficientemente pequeño, y por continuidad de  $P'$  y de  $c \mapsto z(c)$ , se tiene que  $P'(z(c)) \neq 0$  y la raíz  $z(c)$  es simple. Puesto que  $\mathbb{C} - \mathcal{D}$  es abierto, se puede tomar  $U \subset \mathbb{C} - \mathcal{D}$  y  $P(z) - c$  no tiene ninguna raíz doble, por lo tanto  $U \subset R$ .
- $R$  es cerrado. en  $\mathbb{C} - \mathcal{D}$ . Se considera una sucesión  $c_n \rightarrow c_\infty \in \mathbb{C} - \mathcal{D}$ , con  $c_n \in R$ . Se puede elegir una raíz simple  $z_n$  de  $P(z) - c_n$ . La sucesión  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es acotada puesto que  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es acotada, en tanto que sucesión convergente y, cuando  $z \rightarrow \infty$ ,  $P(z)/z^d \rightarrow 1$  pues  $P$  es un polinomio mónico, por lo tanto, cuando  $z$  es grande,  $z$  no puede ser raíz de  $P(z) - c_n$ . Luego, se puede extraer una subsucesión convergente  $(z_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ . Por continuidad, el límite es una raíz de  $P(z) - c_\infty$ , por lo tanto, este polinomio tiene raíces. Además, todas sus raíces son simples pues  $c_\infty \in \mathbb{C} - \mathcal{D}$ .
- $R$  es un conjunto no vacío. Para cada  $a \in \mathbb{C}$  se tiene que para  $c = P(a)$ ,  $P(z) - c$  tiene al menos  $z = a$  como raíz. Si se toma  $a \in \mathbb{C} - P^{-1}(\mathcal{D})$ , entonces para cualquier raíz  $z_0$  de  $P(z) - c$  con  $c = P(a)$  se tiene  $P(z_0) = P(a) \notin \mathcal{D}$ , luego  $z_0 \notin P^{-1}(\mathcal{D})$ , pero  $\mathcal{C} \subset P^{-1}(\mathcal{D})$ ,  $z_0 \notin \mathcal{C}$ , y la raíz  $z_0$  es simple.

Por lo anterior, el conjunto  $R$  es no vacío, abierto y cerrado en el conjunto conexo  $\mathbb{C} - \mathcal{D}$ , lo cual demuestra que  $R = \mathbb{C} - \mathcal{D}$ . Finalmente, una de dos:

- Si  $0 \in \mathcal{D}$ , entonces  $0 = P(z_0)$  para un punto crítico  $z_0$  de  $P$ , que también es una raíz de  $P$ .
- Si  $0 \notin \mathcal{D}$ , entonces  $0 \in R = \mathbb{C} - \mathcal{D}$  y la ecuación  $P(z) - 0 = 0$  tiene raíces simples.

En todos los casos,  $P$  tiene una raíz. Q.E.D.

### 3. COMENTARIOS

La demostración precedente está inspirada de una bella demonstración de Daniel Litt (Litt, D., 2011), que trabaja en el espacio global de polinomios mónicos de grado  $d \geq 1$  (biholomorfo a  $\mathbb{C}^d$ ). Quitando la variedad algebraica  $\mathcal{D}_d$  de polinomios con una raíz doble, que está definida por la anulación del discriminante de los polinomios. Utiliza entonces que el complemento de una variedad algebraica estricta en  $\mathbb{C}^d$  es conexo. Esencialmente nuestra demostración consigue lo mismo de una forma más elemental trabajando en un espacio de polinomios de dimensión 1. En particular, sólo se precisa saber que el complemento de un conjunto finito en el plano es conexo (lo cual, para  $d = 1$ , es lo mismo que la conexidad del complemento de un subconjunto algebraico propio de  $\mathbb{C}^d$ ). También se evita el uso de discriminantes.

Por supuesto, para un Teorema tan fundamental y con tantas demostraciones, es ilusorio pretender originalidad. La demostración más próxima que se ha encontrado en la literatura es una demostración publicada en el American Mathematical Monthly de Anindya Sen (Sen, A., 2000) que es ligeramente menos elemental al utilizar la propiedad topológica de un polinomio de ser propio.

Es interesante observar, que todos los argumentos de la demostración son válidos cuando el cuerpo de base es el cuerpo de los reales  $\mathbb{R}$ , salvo la propiedad fundamental que cuando se quita un punto a  $\mathbb{R}$  queda un espacio desconexo.

### Agradecimientos

Agradezco a mis amigos Marie-Claude Arnaud, Kingshook Biswas, David Blázquez, Alain Chenciner y Yann Levagnini por sus comentarios y sugerencias que han mejorado notablemente la presentación. En particular a Kingshook por una simplificación.

### Referencias

- Litt, D. (2011). Yet another proof of the Fundamental Theorem of Algebra [En línea], Manuscript. Disponible en: [www.daniellitt.com/blog/2016/10/6/a-minimal-proof-of-the-fundamental-theorem-of-algebra](http://www.daniellitt.com/blog/2016/10/6/a-minimal-proof-of-the-fundamental-theorem-of-algebra)
- Sen, A. (2000). Fundamental Theorem of Algebra- Yet another proof, *The American Mathematical Monthly*, 107, 9, 842-843.